

ÍNDICE DE LAS NUEVAS NANDAS DE 2019

Edición 2018 - 2020

CÓDIGO	ETIQUETA	PÁGINA
273	DESEQUILIBRIO DEL CAMPO ENERGÉTICO	2
271	DINÁMICA DE ALIMENTACIÓN INEFICAZ DEL LACTANTE.....	4
269	DINÁMICA DE COMIDAS INEFICAZ DEL ADOLESCENTE	6
270	DINÁMICA DE COMIDAS INEFICAZ DEL NIÑO	8
262	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR LA ALFABETIZACIÓN EN SALUD.....	11
266	RIESGO DE INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA.....	12
265	RIESGO DE LESIÓN OCUPACIONAL.....	13
272	RIESGO DE MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA.....	14
261	RIESGO DE SEQUEDAD BUCAL.....	15
259	RIESGO DE SÍNDROME DE ABSTINENCIA AGUDO	16
263	RIESGO DE SÍNDROME DE DESEQUILIBRIO METABÓLICO	17
267	RIESGO DE TENSIÓN ARTERIAL INESTABLE	18
274	RIESGO DE TERMORREGULACIÓN INEFICAZ	19
260	RIESGO DE TRANSICIÓN MIGRATORIA COMPLICADA	20
268	RIESGO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO	21
258	SÍNDROME DE ABSTINENCIA AGUDO	22
264	SÍNDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL	23

273 DESEQUILIBRIO DEL CAMPO ENERGÉTICO - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

Alteración en fluido vital de energía humana, que habitualmente es un todo continuo, que es único, dinámico, creativo y no lineal.

- Atracción magnética hacia un área del campo de energía.
- Bloqueo del fluido de energía.
- Congestión del fluido de energía.
- Déficit energético en el fluido de energía.
- Diferenciales de temperatura de calor en el fluido de energía.
- Diferenciales de temperatura de frío en el fluido de energía.
- Expresión de la necesidad de recuperar la experiencia del todo.
- Hiperactividad del fluido de energía.
- La frecuencia del campo de energía varía de la pulsación al martilleo.
- Las pulsaciones se sienten en el fluido de energía.
- Patrones congestionados del campo de energía.
- Patrones del campo de energía aleatorios.
- Patrones del campo de energía arrítmicos.
- Patrones del campo de energía con ritmos disonantes.
- Patrones del campo de energía débiles.
- Patrones del campo de energía desordenados.
- Patrones del campo de energía fuertes.
- Patrones del campo de energía lentos.
- Patrones del campo de energía rápidos.
- Patrones irregulares del campo de energía.
- Sensación de hormigueo en el fluido de energía.
- Sensación de ritmos desincronizados en el fluido de energía.

- Ansiedad.
- Disconfort.
- Dolor.
- Estrés excesivo.

31 Características/Factores

22

- Característica definitoria
- Característica definitoria
- Característica definitoria
- Característica definitoria
- Característica definitoria
- Característica definitoria
- Característica definitoria
- Característica definitoria
- Característica definitoria
- Característica definitoria
- Característica definitoria
- Característica definitoria
- Característica definitoria
- Característica definitoria
- Característica definitoria
- Característica definitoria
- Característica definitoria
- Característica definitoria
- Característica definitoria
- Característica definitoria

5

- Factor relacionado
- Factor relacionado
- Factor relacionado
- Factor relacionado

Características y Factores NANDA

Actualizada a la
2018-2020

CODIGO **DIAGNOSTICO**

Características y Factores

Tipo

- Intervenciones que alteran el patrón o el fluido energético.
- Estados de crisis.
- Transiciones de vida.
- Enfermedad.
- Lesión.

Factor relacionado
2
Población de riesgo
Población de riesgo
2
Problemas asociados
Problemas asociados

271 DINÁMICA DE ALIMENTACIÓN INEFICAZ DEL LACTANTE - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

28 Características/Factores

Conductas parentales de alimentación del niño que resultan en patrones de sobrealimentación o alimentación por debajo de las necesidades.

- Bajo apetito.
- Ingesta inferior a las necesidades.
- Rechazo a los alimentos.
- Sobrealimentación.
- Transición inadecuada a los alimentos sólidos.

- Cuidados múltiples.
- Estilo parental desacoplado.
- Estilo parental despreocupado.
- Estilo parental sobreprotector.
- Falta de confianza en el desarrollo adecuado del niño.
- Falta de confianza en el niño para desarrollar hábitos alimentarios saludables.
- Falta de conocimiento de cada estado de desarrollo del niño.
- Falta de conocimiento de las responsabilidades parentales en la alimentación del niño.
- Falta de conocimiento de los métodos adecuados de alimentación del niño en cada estado del desarrollo.
- Influencia de los medios de comunicación en el conocimiento de los alimentos calóricos no saludables.
- Influencia de los medios de comunicación en el uso de alimentos calóricos no saludables en la alimentación del niño.
- Problemas de vinculación.
- Relaciones abusivas.

- Abandono del lactante.
- Bajo peso para la edad gestacional.
- En desventaja económica.
- Experiencias neonatales en unidades de cuidados intensivos.
- Historia de experiencias de nutrición y alimentación no seguras.
- Hospitalización prolongada.
- Implicación con el sistema de cuidados de adopción.

5

Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria

13

Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado

10

Población de riesgo
Población de riesgo
Población de riesgo
Población de riesgo
Población de riesgo
Población de riesgo
Población de riesgo

Características y Factores NANDA

Actualizada a la
2018-2020

CODIGO **DIAGNOSTICO**

Características y Factores

- Prematuridad.
- Sin techo.
- Transiciones de vida.

Tipo

Población de riesgo
Población de riesgo
Población de riesgo

CODIGO DIAGNOSTICO

Características y Factores

Tipo

269 DINÁMICA DE COMIDAS INEFICAZ DEL ADOLESCENTE - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

30 Características/Factores

Actitudes y comportamientos nutricionales alterados que resultan en patrones de sobrealimentación o alimentación por debajo de las necesidades y que comprometen la salud nutricional.

- Acostumbra a comer en restaurantes de comida rápida.
- Acostumbra a ingerir alimentos de baja calidad.
- Acostumbra a ingerir alimentos procesados.
- Bajo apetito.
- Evita la participación en las horas regulares de las comidas.
- Ingesta inferior a las necesidades.
- Picoteo frecuente.
- Rechazo a los alimentos.
- Se queja de hambre entre comidas.
- Sobrealimentación.

- Abuso psicológico.
- Ansiedad.
- Cambios en la autoestima al entrar en la pubertad.
- Comer en aislamiento.
- Depresión.
- Dinámicas familiares alteradas.
- Elección de alimentos inadecuada.
- Estrés excesivo.
- Excesivo control familiar a las horas de la comida.
- Horas de comida estresantes.
- Horas de comida irregulares.
- Influencia de los medios de comunicación en el conocimiento de los alimentos calóricos no saludables.
- Influencia de los medios de comunicación en las conductas de ingestión de alimentos calóricos no saludables.
- Influencia parental negativa en las conductas alimentarias.
- Negligencia psicológica.

10

Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria

16

Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado

Características y Factores NANDA

Actualizada a la
2018-2020

CODIGO **DIAGNOSTICO**

Características y Factores

Tipo

-
- | | |
|--|---------------------|
| - Trastorno alimentario. | Factor relacionado |
| - Problemas de salud física parental. | 4 |
| - Problemas de salud psicológica parental. | Problemas asociados |
| - Reto físico con la alimentación. | Problemas asociados |
| - Reto físico con las comidas. | Problemas asociados |

CODIGO DIAGNOSTICO

Características y Factores

Tipo

270 DINÁMICA DE COMIDAS INEFICAZ DEL NIÑO - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

52 Características/Factores

Actitudes y comportamientos nutricionales alterados del niño que resultan en patrones de sobrealimentación o alimentación por debajo de las necesidades y que comprometen la salud nutricional.

- Acostumbra a comer en restaurantes de comida rápida.
- Acostumbra a ingerir alimentos de baja calidad.
- Acostumbra a ingerir alimentos procesados.
- Bajo apetito.
- Evita la participación en las horas regulares de las comidas.
- Ingesta inferior a las necesidades.
- Picoteo frecuente.
- Rechazo a los alimentos.
- Se queja de hambre entre comidas.
- Sobrealimentación.

Ambientales

- Influencia de los medios de comunicación en el conocimiento de los alimentos calóricos no saludables.
- Influencia de los medios de comunicación en las conductas de ingestión de alimentos calóricos no saludables.

Hábitos alimentarios

- Comer en aislamiento.
- Consumir grandes volúmenes de alimentos en un corto período de tiempo.
- Elección de alimentos inadecuada.
- Excesivo control parental sobre la experiencia de alimentación del niño.
- Excesivo control parental sobre las horas de comida familiares.
- Falta de horas de comida regulares.
- Forzar al niño a comer.
- Hábitos de alimentación desordenados.
- Horas de comida estresantes.
- Limitar la alimentación del niño.
- Patrones de alimentación impredecibles.
- Picoteo no estructurado entre comidas.

10

Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria

2

Factor relacionado
Factor relacionado

14

Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado

Características y Factores NANDA

Actualizada a la
2018-2020

CODIGO DIAGNOSTICO

Características y Factores	Tipo
- Premiar al niño por comer.	Factor relacionado
- Sobornar al niño para que coma.	Factor relacionado
Parental	9
- Anorexia.	Factor relacionado
- Depresión.	Factor relacionado
- Estrategias de afrontamiento ineficaces.	Factor relacionado
- Falta de confianza en el desarrollo adecuado del niño.	Factor relacionado
- Falta de confianza en el niño para desarrollar hábitos alimentarios saludables.	Factor relacionado
- Incapacidad de repartir la responsabilidad de la alimentación entre los padres y el niño.	Factor relacionado
- Incapacidad para apoyar un patrón de nutrición saludable.	Factor relacionado
- Incapacidad para repartir la responsabilidad de la comida entre los padres y el niño.	Factor relacionado
- Mal uso de sustancias.	Factor relacionado
Procesos familiares	8
- Estilo parental desacoplado.	Factor relacionado
- Estilo parental despreocupado.	Factor relacionado
- Estilo parental sobreprotector.	Factor relacionado
- Relación de inseguridad padres-hijo.	Factor relacionado
- Relación padres-hijo hostil.	Factor relacionado
- Relación padres-hijo tensa.	Factor relacionado
- Relaciones abusivas.	Factor relacionado
- Relaciones de ansiedad padres-hijo.	Factor relacionado
5	5
- En desventaja económica.	Población de riesgo
- Implicación con el sistema de cuidados de adopción.	Población de riesgo
- Obesidad parental.	Población de riesgo
- Sin techo.	Población de riesgo
- Transiciones de vida.	Población de riesgo
4	4
- Problemas de salud física parental.	Problemas asociados
- Problemas de salud psicológica parental.	Problemas asociados

Características y Factores NANDA

Actualizada a la
2018-2020

CODIGO **DIAGNOSTICO**

Características y Factores

- Reto físico con la alimentación.
- Reto físico con las comidas.

Tipo

Problemas asociados
Problemas asociados

CODIGO DIAGNOSTICO

Características y Factores

Tipo

262 DISPOSICIÓN PARA MEJORAR LA ALFABETIZACIÓN EN SALUD - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

9 Características/Factores

Patrón de uso y desarrollo de un conjunto de habilidades y competencias (alfabetización, conocimiento, motivación, cultura y lenguaje) dirigidos a encontrar, comprender, evaluar y utilizar la información y los conceptos de salud con la finalidad de tomar decisiones diarias relacionadas con la salud, para promover y mantenerla, disminuir los riesgos vinculados a la salud y mejorar, a nivel global, la calidad de vida, que puede ser reforzado.

- Expresa deseo de mejorar el apoyo social para la salud.
- Expresa deseo de mejorar el conocimiento de los determinantes de salud habituales que impactan sobre el entorno social y físico.
- Expresa deseo de mejorar la comprensión de la información de salud para realizar elecciones de cuidados de salud.
- Expresa deseo de mejorar la comprensión de las costumbres y creencias para tomar decisiones relacionadas con los cuidados de salud.
- Expresa deseo de mejorar la comunicación con los proveedores de salud.
- Expresa deseo de mejorar la habilidad para leer, escribir, hablar e interpretar los valores relacionados con las necesidades diarias de salud.
- Expresa deseo de mejorar la toma de decisiones sobre los cuidados de salud personal.
- Expresa deseo de mejorar la vigilancia de los procesos civiles y/o gubernamentales que impactan sobre la salud pública.
- Expresa deseo de obtener información suficiente para orientarse en el sistema de salud.

9

Característica definitoria

Característica definitoria

Característica definitoria

Característica definitoria

Característica definitoria

Característica definitoria

Característica definitoria

Característica definitoria

Característica definitoria

Características y Factores NANDA

Actualizada a la
2018-2020

CODIGO DIAGNOSTICO

Características y Factores

Tipo

266 RIESGO DE INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

22 Características/Factores

Susceptible de sufrir una invasión de organismos patógenos de la herida quirúrgica, que puede comprometer la salud.

- Alcoholismo.
- Obesidad.
- Tabaquismo.

- Aumento de la exposición ambiental a patógenos.
- Contaminación de la herida quirúrgica.
- Número excesivo de personas presentes durante el procedimiento quirúrgico.
- Puntuación ≥ 2 según la clasificación del estado físico de la American Society of Anesthesiologists (ASA).
- Temperatura baja en el quirófano.

- Artritis reumatoide.
- Comorbilidad.
- Diabetes mellitus.
- Duración de la intervención quirúrgica.
- Hipertensión.
- Infecciones en otras heridas quirúrgicas.
- Inmunosupresión.
- Osteoartritis postraumática.
- Procedimiento invasivo.
- Profilaxis antibiótica inadecuada.
- Profilaxis antibiótica ineficaz.
- Tipo de anestesia.
- Tipo de procedimiento quirúrgico.
- Uso de implantes y prótesis.

3

Factor de riesgo

Factor de riesgo

Factor de riesgo

5

Población de riesgo

Población de riesgo

Población de riesgo

Población de riesgo

Población de riesgo

14

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

265 RIESGO DE LESIÓN OCUPACIONAL - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

Susceptible de sufrir un accidente o enfermedad relacionado con el trabajo, que puede comprometer la salud.

Ambientales

- "Síndrome de estar quemado" laboral.
- Carga de trabajo físico.
- Distracción a causa de las relaciones sociales.
- Entorno físico inadecuado.
- Exposición a agentes biológicos.
- Exposición a agentes químicos.
- Exposición a agentes teratógenos.
- Exposición a la vibración.
- Exposición a radiación.
- Exposición a temperaturas extremas.
- Exposición al ruido.
- Falta de equipo personal de protección.
- Relaciones laborales.
- Rotación de turnos de trabajo de noche y día.
- Turno de trabajo.

Individual

- Actuaciones inseguras a causa de exceso de confianza.
- Actuaciones inseguras a causa de hábitos negativos no saludables.
- Conocimiento insuficiente.
- Desarrollo inadecuado del rol.
- Estrategias de afrontamiento ineficaces.
- Estrés excesivo.
- Gestión ineficaz del tiempo.
- Interpretación errónea de la información.
- Malestar psicológico.
- Uso incorrecto del equipamiento personal de protección.

25 Características/Factores

15

- Factor de riesgo
- Factor de riesgo
- Factor de riesgo
- Factor de riesgo
- Factor de riesgo
- Factor de riesgo
- Factor de riesgo
- Factor de riesgo
- Factor de riesgo
- Factor de riesgo
- Factor de riesgo
- Factor de riesgo
- Factor de riesgo
- Factor de riesgo

10

- Factor de riesgo
- Factor de riesgo
- Factor de riesgo
- Factor de riesgo
- Factor de riesgo
- Factor de riesgo
- Factor de riesgo
- Factor de riesgo
- Factor de riesgo

Características y Factores NANDA

Actualizada a la
2018-2020

CODIGO DIAGNOSTICO

Características y Factores

Tipo

272 RIESGO DE MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

10 Características/Factores

Susceptible de sufrir una ablación total o parcial de los genitales externos femeninos y otras lesiones genitales, ya sea por razones culturales, religiosas u otras razones no terapéuticas, que pueden comprometer la salud.

- Falta de conocimiento familiar sobre el impacto de la práctica sobre la salud física.
- Falta de conocimiento familiar sobre el impacto de la práctica sobre la salud psicosocial.
- Falta de conocimiento familiar sobre el impacto de la práctica sobre la salud reproductiva.

- Familia que presenta una actitud favorable a la práctica.
- Género femenino.
- Los líderes familiares pertenecen a un grupo étnico en el que la práctica es aceptada.
- Pertenecer a un grupo étnico en el que la práctica es aceptada.
- Pertenecer a una familia en la que algún miembro femenino ha sido objeto de la práctica.
- Planificar una visita al país originario familiar.
- Residir en un país donde la práctica es aceptada.

3

Factor de riesgo

Factor de riesgo

Factor de riesgo

7

Población de riesgo

Población de riesgo

Población de riesgo

Población de riesgo

Población de riesgo

Población de riesgo

Población de riesgo

CODIGO DIAGNOSTICO

Características y Factores

Tipo

261 RIESGO DE SEQUEDAD BUCAL - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

13 Características/Factores

Susceptible de sufrir molestias o lesiones en la mucosa oral a causa de una reducción de la cantidad o la calidad de la saliva que hidrata la mucosa, que puede comprometer la salud.

- Depresión.
- Deshidratación.
- Estrés excesivo.
- Excitación.
- Tabaquismo.

- Agente farmacológico.
- Embarazo.
- Enfermedades sistémicas.
- Incapacidad para alimentarse por vía oral.
- Oxigenoterapia.
- Quimioterapia.
- Radioterapia en la cabeza o el cuello.
- Restricción de líquidos.

5

Factor de riesgo
Factor de riesgo
Factor de riesgo
Factor de riesgo
Factor de riesgo

8

Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados

Características y Factores NANDA

Actualizada a la
2018-2020

CODIGO DIAGNOSTICO

Características y Factores

Tipo

259 RIESGO DE SÍNDROME DE ABSTINENCIA AGUDO - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

8 Características/Factores

- Cese súbito de una sustancia adictiva.
- Dependencia desarrollada al alcohol u otra sustancia adictiva.
- Malnutrición.
- Uso abusivo de una sustancia adictiva a lo largo del tiempo.

- Adultos mayores.
- Antecedentes de síntomas de abstinencia.

- Enfermedad física grave comórbida.
- Trastornos mentales comórbidos.

4

Factor de riesgo

Factor de riesgo

Factor de riesgo

Factor de riesgo

2

Población de riesgo

Población de riesgo

2

Problemas asociados

Problemas asociados

Características y Factores NANDA

Actualizada a la
2018-2020

CODIGO DIAGNOSTICO

Características y Factores

Tipo

263 RIESGO DE SÍNDROME DE DESEQUILIBRIO METABOLICO - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

17 Características/Factores

Susceptible de un conjunto tóxico de factores bioquímicos y psicológicos

- Estilo de vida sedentario (168).
- Estrés por sobrecarga (177).
- Mantenimiento ineficaz de la salud (99).
- Obesidad (232).
- Riesgo de nivel de glucemia inestable (179).
- Sobrepeso (233).
- Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud (188).

- Antecedentes familiares de diabetes mellitus.
- Antecedentes familiares de dislipemia.
- Antecedentes familiares de obesidad.
- Antecedentes familiares de hipertensión.
- Edad > 30 años.

- Ácido úrico > 7 mg/dl.
- Corticoides endógenos o exógenos excesivos > 25 g/dl.
- Microalbuminuria > 30 md/dl.
- Síndrome de ovario poliquístico.
- Tensión arterial inestable.

7

Factor de riesgo
Factor de riesgo
Factor de riesgo
Factor de riesgo
Factor de riesgo
Factor de riesgo
Factor de riesgo

5

Población de riesgo
Población de riesgo
Población de riesgo
Población de riesgo

5

Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados

Características y Factores NANDA

Actualizada a la
2018-2020

CODIGO DIAGNOSTICO

Características y Factores

Tipo

267 RIESGO DE TENSIÓN ARTERIAL INESTABLE. - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

Susceptible de existir fluctuación del flujo en el paso de la sangre a través de los vasos arteriales, que puede comprometer la salud.

- Falta de coherencia con el régimen de tratamiento.
- Ortostasis.

- Absorción y distribución rápida de agentes antiarrítmicos.
- Absorción y distribución rápida de agentes diuréticos.
- Absorción y distribución rápida de agentes vasodilatadores.
- Aumento de la presión intracraneal.
- Cambios en los líquidos.
- Cambios hormonales.
- Desequilibrio electrolítico.
- Disritmia cardíaca.
- Efectos adversos de esteroides.
- Efectos adversos de la cocaína.
- Efectos adversos de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE).
- Hiperparatiroidismo.
- Hipertiroidismo.
- Hipotiroidismo.
- Respuestas simpáticas.
- Retención de líquidos.
- Síndrome de Cushing.
- Soluciones hiperosmolares.
- Uso de agentes antidepresivos.

21 Características/Factores

2

Factor de riesgo

Factor de riesgo

19

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Problemas asociados

Características y Factores NANDA

Actualizada a la
2018-2020

CODIGO DIAGNOSTICO

Características y Factores

Tipo

274 RIESGO DE TERMORREGULACIÓN INEFICAZ - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

21 Características/Factores

Susceptible de padecer una fluctuación de la temperatura entre la hipotermia y la hipertermia, que puede comprometer la salud.

- Actividad vigorosa.
- Aumento de la demanda de oxígeno.
- Deshidratación.
- Fluctuación en la temperatura ambiente.
- Inactividad.
- Vestimenta inadecuada para la temperatura ambiental.

- Aumento de la superficie corporal en relación al peso.
- Edades extremas.
- Pesos extremos.
- Reserva de grasa subcutánea insuficiente.
- Temperatura ambiente extrema.

- Agente farmacológico.
- Alteración de la tasa metabólica.
- Disminución de la respuesta sudorativa.
- Enfermedad.
- Lesión cerebral.
- Problema que afecta la regulación de la temperatura.
- Sedación.
- Sepsis.
- Termogénesis sin temblor ineficaz.
- Traumatismo.

6

Factor de riesgo
Factor de riesgo
Factor de riesgo
Factor de riesgo
Factor de riesgo
Factor de riesgo

5

Población de riesgo
Población de riesgo
Población de riesgo
Población de riesgo
Población de riesgo

10

Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados

CODIGO DIAGNOSTICO

Características y Factores

Tipo

260 RIESGO DE TRANSICIÓN MIGRATORIA COMPLICADA - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

19 Características/Factores

Susceptible de experimentar sentimientos negativos (soledad, temor, ansiedad) como respuesta a las consecuencias no satisfactorias y a las barreras culturales de la transición migratoria personal, que pueden comprometer la salud.

- Alojamiento masificado.
- Apoyo social insuficiente en el país receptor.
- Barreras culturales en el país receptor.
- Barreras lingüísticas en el país receptor.
- Condiciones insalubres de la vivienda.
- Conflictos parento-filiales relacionados con la enculturación en el país receptor.
- Conocimiento insuficiente sobre el proceso para acceder a los recursos en el país receptor.
- Convivencia en la misma casa de muchas personas que no mantienen ninguna relación.
- Discriminación abierta.
- El trabajo disponible está por debajo de la formación educativa.
- Propietario del alojamiento abusivo.

- Condiciones de trabajo peligrosas por preparación inadecuada.
- Explotación laboral.
- Incumplimiento de las expectativas de la migración.
- Migración forzosa.
- Separación de la familia del país de origen.
- Separación de los amigos del país de origen.
- Situación económica precaria.
- Situación ilegal en el país receptor.

11

Factor de riesgo
Factor de riesgo
Factor de riesgo
Factor de riesgo
Factor de riesgo
Factor de riesgo
Factor de riesgo
Factor de riesgo
Factor de riesgo
Factor de riesgo

8

Población de riesgo
Población de riesgo
Población de riesgo
Población de riesgo
Población de riesgo
Población de riesgo
Población de riesgo

Características y Factores NANDA

Actualizada a la
2018-2020

CODIGO DIAGNOSTICO

Características y Factores

Tipo

268 RIESGO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

22 Características/Factores

Susceptible de desarrollar un trombo en una vena profunda, generalmente en el muslo, la pantorrilla o la extremidad superior, que puede desprenderse y alojarse en otro vaso, y que puede comprometer la salud.

- Deshidratación.
- Deterioro de la movilidad.
- Obesidad.

- Antecedentes de accidente cerebrovascular.
- Antecedentes de tromboembolismo venoso.
- Edad > 60 años.
- Familiar de primer grado con antecedentes de tromboembolismo venoso.
- Fumador habitual.
- Ingreso en cuidados críticos.
- Posparto de menos de 6 semanas.

- Accidentes cerebrovascular.
- Cirugía y tiempo total de anestesia > 90 minutos.
- Comorbilidad médica significativa.
- Diagnóstico de cáncer.
- Postoperatorio de cirugía mayor.
- Postoperatorio de cirugía ortopédica.
- Traumatismo de la extremidad superior.
- Traumatismo en la zona inferior a la cintura.
- Trombofilia.
- Uso de contraceptivos que contienen estrógenos.
- Uso de terapia de reemplazo hormonal.
- Venas varicosas.

3

Factor de riesgo
Factor de riesgo
Factor de riesgo

7

Población de riesgo
Población de riesgo
Población de riesgo
Población de riesgo
Población de riesgo
Población de riesgo

12

Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados
Problemas asociados

Características y Factores NANDA

Actualizada a la
2018-2020

CODIGO DIAGNOSTICO

Características y Factores

Tipo

258 SÍNDROME DE ABSTINENCIA AGUDO - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

14 Características/Factores

Secuelas importantes, multifactoriales que ocurren como consecuencia del cese abrupto de un compuesto adictivo.

- Ansiedad (146).
- Confusión aguda (128).
- Náuseas (134).
- Riesgo de desequilibrio electrolítico (195).
- Riesgo de lesión (35).
- Trastorno del patrón del sueño (198).

- Cese súbito de una sustancia adictiva.
- Dependencia desarrollada al alcohol u otra sustancia adictiva.
- Malnutrición.
- Uso abusivo de una sustancia adictiva a lo largo del tiempo.

- Adultos mayores.
- Antecedentes de síntomas de abstinencia.

- Enfermedad física grave comórbida.
- Trastornos mentales comórbidos.

6

Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria

4

Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado
Factor relacionado

2

Población de riesgo
Población de riesgo

2

Problemas asociados
Problemas asociados

CODIGO DIAGNOSTICO

Características y Factores

Tipo

264 SÍNDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL - EDICIÓN: 2019, NDE 2.1

13 Características/Factores

Constelación de síntomas observados en los recién nacidos como resultado de la exposición intrauterina a sustancias adictivas, o como consecuencia de la gestión farmacológica del dolor postnatal.

- Conducta desorganizada del lactante (116).
- Diarrea (13).
- Disconfort (214).
- Estrés neurocomportamental.
- Patrón de alimentación ineficaz del lactante (107).
- Riesgo de aspiración (39).
- Riesgo de deterioro de la integridad cutánea (47).
- Riesgo de deterioro de la vinculación (58).
- Riesgo de lesión (35).
- Riesgo de termorregulación ineficaz (274).
- Trastorno del patrón del sueño (198).

- Exposición a sustancias iatrogénicas para el control del dolor tras una enfermedad crítica o cirugía.
- Exposición a sustancias intrauterinas secundaria al uso materno de sustancias.

11

Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria
Característica definitoria

2

Población de riesgo
Población de riesgo